


BS-Pm-204(d)-00

利福平胶

名称】	利福平
用名称:	Rifampin
文名称:	利福平
语拼音:	Lifuping
学名称:	3-[[4-methyl-1-piperazinyl]phenyl]-2,4,6-trimethyl-5-pyrimidinol
学结构式:	(4-甲基-1-哌嗪基) 亚氨基苯基-2,4,6-三甲基-5-嘧啶醇



剂，内服。本品为紫蓝色蜡状固体。本品与其他抗结核药物联合用于各种结核病的初治。本品与其他药物联合用于麻风、非结核分枝杆菌、真菌、分枝杆菌、立克次体、衣原体、支原体、弓形虫、阿米巴原虫、滴虫、贾第虫、微孢子虫、隐孢子虫、等。本品可联合用于甲氧西林耐药菌。

【用法】口服，每次0.45g(2粒)，一日一次或遵医嘱。

见，口服本品后可出现厌食、恶
要不良反应，发生率约1%。在
清氨基转移酶一过性升高，在
易发生。
撤方法后偶可出现“流感样症
剂量大小及间歇时间有明显关
后，大小便、唾液、痰液、泪

品或利福霉素类抗菌药过敏者禁用。
能严重不全、肝功能障碍和3个月以内孕妇禁用。

中毒、干扰：可损害者慎用。婴儿、3个月以上至
新的干扰钠试验引起直接抗球蛋白试验（Coombs）
磺溴酚钠引起磷酸滞留出现假阳性；可干扰利用分
血清蛋白电泳肝功能

酶、血、肝内氨基酸基转移酶、广

年,甚至数年起白细胞可能引起白细胞减少症,剥牙及牙龈炎,前小细胞性贫血,血小板减少,并导致齿龈出血,严重者可引起再生障碍性贫血。感染细菌性感染时病原菌可侵入骨髓并引起骨髓炎和骨髓坏死,甚至引起弥漫性骨髓炎,导致骨溶解和骨折,可致残或死亡。累及皮肤者可引起蜂窝组织炎等。

或退者不需减量。在肾小球滤过率减低或无尿、胆汁排泄物均可显橘红色。有

长期安全应用。3个

者有无肝毒性出现。
6小时。

素、维拉帕米(异搏
地黄苷类、丙吡胺、
奎尼丁外，在用利
福平，据以调整剂量。
出血和计划外妊

力，促使白细胞减

合用时后两者需调

故通常不宜加用丙

。酗酒者或同服其他

利福平，有严重恶

部分非结核分枝杆
菌作用，包括葡萄
球菌、荚膜杆菌、白喉杆
菌。利福平对军团

抑制细菌RNA的合成，

为7~9mg/L，6个
包括脑脊液，当脑
脊液浓度为1.6L/kg。蛋
白，多次给药后有所
活性的代谢物25-去

给药量经粪便排出，
乳汁排出。肾功能减
低；用高剂量后由于